

Ornithologischer Reisebericht:

Dänische Nordseeküste bei Husby



8. bis 21. Juli 2012

Eine kommentierte Auflistung der beobachteten Vogelarten

von Robert Biermann



Dünen- und Heidelandschaft bei Husby

Vorwort

Der kleine Ort Husby liegt an der Nordseeküste im Westen Dänemarks. Hinter dem meist breiten, direkt an den Strand anschließenden Dünengürtel erstrecken sich sandige Heidelandschaften und Kiefernwälder, die vereinzelt von großflächigen (Ferienhaus-) Siedlungen durchzogen sind.

Im Hinterland rahmen der Nissum Fjord (Fjord = Förde) im Nordosten und der Stadil Fjord im Südosten die Ortschaft ein. Rund zehn Kilometer nördlich liegt die kleine Hafenstadt Thorsminde. Hvide Sande, etwa 15 Kilometer südlich gelegen, ist der nächstgrößere Ort, die größte Stadt im weiteren Umkreis ist Ringkøbing, das am gleichnamigen Fjord ca. 40 Kilometer südöstlich gelegen ist.

Weitere in der Artenliste aufgeführte Beobachtungsorte in der Umgebung waren Fjaltring, Søndervig und Holstebro.



Auffliegende Sturmmöwen am Nordseestrand, 13.07.2012

Der Aufenthalt vom 8. bis 21. Juli war von sehr wechselhaftem, meist ungemütlichem Wetter geprägt. Die Temperaturen bewegten sich häufig im milderen Bereich von etwa 15-20°C; der Höchstwert von 26°C wurde bereits am Anreisetag erreicht.

Fast tägliche Exkursionen in die umliegende Landschaft und die benachbarten Städte ergaben dennoch einen guten Überblick über die vorherrschende Vogelwelt. Insgesamt konnten 67 Arten beobachtet werden.

Mein Dank gilt Klaus Sudbrack, der durch seine reiche Ortskenntnis viele Exkursionen und Ausflüge in die Umgebung überhaupt erst anregte, sowie Wolfgang Pott, der in der Nachbereitung bei der Bestimmung einzelner Arten anhand von Belegfotos behilflich war.

Legende:

ad. = adult (Altvogel); subad.: subadult (nicht ausgewachsen); juv. = juvenil (Jungvogel);
pullus/pulli = Dunenjunge(s); M = Männchen; W = Weibchen; PK = Prachtkleid; SK =
Schlichtkleid; Ind. = Individuum/Individuen

Artenliste

Höckerschwan

Cygnus olor

Mute Swan

1 ad. am 12.07. auf dem Nissum Fjord; auf dem Stadil Fjord am 16.07. ~10 Ind. und am 20.07. ca. 30-40 Ind.; 2 ad. mit 6 pulli auf dem Ringköbing Fjord am 19.07.; auf dem Lemvig Sø am 20.07. 1 Paar mit mehreren pulli.

Graugans

Anser anser

Greylag Goose

Regelmäßig auf den Feldern in Fjordnähe zu sehen; Maximalzahlen: 100-150, ~250 und etwa 120 Ind. am 10., 16. und 20.07. am Stadil Fjord.

Pfeifente

Anas penelope

Eurasian Wigeon

Am 10.07. am Stadil Fjord ca. 120 Ind., dort auch am 16.07 um die 60.

Reiherente

Aythya fuligula

Tufted Duck

1 M am 16.07. auf dem Stadil Fjord, vermutlich dort auch zahlreicher vertreten.

Sterntaucher

Gavia stellata

Red-throated Loon

An zwei Tagen jeweils subad. auf der Nordsee: am 09.07. am Strand bei Husby 1 Ind. auf der Nordsee schwimmend und immer wieder tauchend, 1 weiterer in ca. 150 Metern Entfernung nach Norden fliegend; am 11.07. 1 schwimmendes und tauchendes Ind. etwa 5 km nördlich von Husby.



Sterntaucher am 09.07.2012 über der Nordsee bei Husby

Haubentaucher

Podiceps cristatus

Great Crested Grebe

2 ad. am 10.07. auf dem Stadil Fjord; am 20.07. auf dem Lemvig Sø 2 Paare mit pulli.

Basstölpel

Morus bassanus

Northern Gannet

Ca. 3-5 wahrscheinlich subad. Ind. am 09.07. einige hundert Meter vom Strand von Husby entfernt über der Nordsee kreisend; ein Ind. kam bis auf etwa 70 Meter an den Strand heran.



Basstölpel über der Nordsee bei Husby am 09.07.2012

Kormoran

Phalacrocorax carbo

Great Cormorant

2 Ind. am 16.07. am Strand von Husby; am 18. bzw. 19.07. 1 und 2 Überfliegende am Ringköbing Fjord.

Graureiher

Ardea cinerea

Grey Heron

Mehrere Einzelbeobachtungen am Stadil Fjord, darunter max. 2 ad. am 10.07.

Löffler

Platalea leucorodia

Eurasian Spoonbill

4 Ind. am 16.07. am Stadil Fjord auf einer ca. 400 Meter vom Ufer entfernten Insel auf Nahrungssuche.

Rohrweihe

Circus aeruginosus

Western Marsh Harrier

Max. 3 ad. am 10.07. am Stadil Fjord; am 16.07. dort 1 M bzw. 1 W in der Abenddämmerung des 19.07.

Mäusebussard

Buteo buteo

Common Buzzard

1 junges Ind. am 16.07. in der Dünen- und Heidelandschaft um Husby, am 17.07. 1 kreisendes Ind. über dem Ferienhaus.

Turmfalke

Falco tinnunculus

Common Kestrel

Regelmäßig beobachtet, häufigster Greifvogel, insgesamt 11 Ind. in 5 Beobachtungen; max. 4 zeitgleich rüttelnde Ind. über Dünen bei Vedersö.

Blässhuhn*Fulica atra*

Eurasian Coot

Am Stadil Fjord max. 30 Ind. am 16.07.; 1 Paar mit pulli am 20.07. in Thorsminde; insgesamt nur wenige Beobachtungen.

Austernfischer*Haematopus ostralegus*

Eurasian Oystercatcher

Auf Wiese am Stadil Fjord 2 ad. am 10.07.; 2 weitere ad. überfliegend am Strand bei Vedersö am 13.07.; am Strand von Husby am 16.07. 3 die Nordsee überfliegend; dort am 19.07. dann 11 überfliegende Ind.

Sandregenpfeifer*Charadrius hiaticula*

Common Ringed Plover

In der Abenddämmerung des 10.07. am Strand von Vedersö 2 ad. bei der Nahrungssuche; 1 ad. am Strand nördlich von Thorsminde am 15.07.

Goldregenpfeifer*Pluvialis apricaria*

European Golden Plover

2 ad. im PK am Abend des 19.07. unter ca. 70 Kiebitzen am Stadil Fjord.

Kiebitz*Vanellus vanellus*

Northern Lapwing

Die häufigste Limikole, täglich beobachtet; am Stadil Fjord an den drei Beobachtungstagen (10., 16. und 20.07.) je ca. 200 Ind.

Grünschenkel*Tringa nebularia*

Common Greenshank

Am Morgen des 16.07. 2 Ind. zwischen Kiebitzen und Kampfläufern auf einer Wiese am Stadil Fjord.



Grünschenkel am 16.07.2012, Stadil Fjord

Großer Brachvogel*Numenius arquata*

Eurasian Curlew

Insgesamt etwa 69 Ind. in 7 Beobachtungen, dabei Doppelbeobachtungen möglich; maximal ca. 40 juv. am 16.07. am Strand von Husby rastend.

Regenbrachvogel*Numenius phaeopus*

Whimbrel

1 Ind. am 20.07. auf einer Grünfläche am Stadil Fjord landend.



Regenbrachvogel am 20.07.2012, Stadil Fjord

Bekassine*Gallinago gallinago*

Common Snipe

Zwei Beobachtungen am Stadil Fjord: 3-5 Ind. am 16.07., 3 weitere am 20.07.

Kampfläufer*Philomachus pugnax*

Ruff

An drei Beobachtungstagen am Stadil Fjord zwischen Kiebitzen permanent mind. 20 bis max. 40 Ind. (20.07.), teils im PK, teils bereits stark mausernd.



20.07.2012: Kampfläufer (links w, rechts m) am Stadil Fjord

Zwergmöwe

Hydrocoloeus minutus

Little Gull

Am 09.07. schwimmt 1 Ind. im 1. Sommer (2. Kalenderjahr) in Strandnähe auf der Nordsee zwischen Husby und Thorsminde.



Zwergmöwe im 2. KJ, Nordsee zwischen Husby und Thorsminde am 09.07.2012

Lachmöwe

Larus ridibundus

Black-headed Gull

Täglich auch in größerer Zahl beobachtet: ~50 Ind. am 16.07. am Stadil Fjord und etwa 150 Ind. am 19.07. nach starkem Regenschauer mit anderen Möwen- und Seeschwalbenarten am Strand von Husby rastend.

Sturmmöwe

Larus canus

Mew Gull

Tägliche Beobachtungen, fast so häufig wie Lachmöwe; max. etwa 60 Ind. am 19.07. am Strand von Husby, mit anderen Möwen und Seeschwalben vergesellschaftet.

Silbermöwe

Larus argentatus

European Herring Gull

Mit Abstand häufigste Großmöwe, täglich beobachtet, dabei aber weniger zahlreich als die kleineren Sturm- und Lachmöwen. Maximum mit ca. 50 Ind. am 19.07. am Strand von Husby.

Heringsmöwe

Larus fuscus

Lesser Black-backed Gull

Nicht häufig, aber sehr regelmäßig beobachtet; maximal 10 Ind. am 15.07. an der buhngesäumten Küste bei Fjaltring und etwa 20 Ind. am 19.07. am Strand von Husby mit anderen Möwenarten und Seeschwalben vergesellschaftet.

Mantelmöwe*Larus marinus*

Great Black-backed Gull

Am 08.07. 1 subad. Ind. überfliegend in Thorsminde; am Hafen von Hvide Sande am 10.07. 1 ad. im PK; am 13.07. am Strand zwischen Husby und Vedersö 1 ad. im PK; 2 Ind. am 19.07. in Möwenschwarm am Stadil Fjord.



10.07.2012: adulte Mantelmöwe im Hafen von Hvide Sande

Brandseeschwalbe*Sterna sandvicensis*

Sandwich Tern

Die am häufigsten beobachtete und am weitesten verbreitete Seeschwalbenart, oft vom Strand aus bei der Jagd zu beobachten, erstmals am 10.07.; häufig in Kleingruppen von fünf bis zehn Vögeln im losen Verbund die Wasserkante entlang jagend; Maximalzahlen mit fast 30 Ind. am 15.07. an Strandabschnitt nördlich von Thorsminde und rund 80 Ind. am Strand von Husby rastend, mit Möwen, Fluss- und Küstenseeschwalben vergesellschaftet.



Brandseeschwalbe bei der Jagd, Nordsee bei Husby, 19.07.2012

Flussseeschwalbe*Sterna hirundo*

Common Tern

Sechs Beobachtungstage, dabei am 19.07. etwa 80 Ind. nach starkem Regen mit Möwen und anderen Seeschwalben am Strand von Husby rastend.



Flussseeschwalbe, Nordsee bei Husby, 15.07.2012

Küstenseeschwalbe*Sterna paradisea*

Arctic Tern

Fünf Beobachtungstage, auch zahlenmäßig geringer vertreten als die sehr ähnliche Flussseeschwalbe; ca. 50 Ind. am 19.07. unter rastenden Möwen und anderen Seeschwalben am Strand von Husby.



Küstenseeschwalbe, Nordsee bei Husby, 09.07.2012

Straßentaube*Columba livia f. domestica*

Feral Pigeon

Täglich beobachtet, dabei in Städten wie Holstebro und Ringköbing deutlich häufiger als in den weniger dicht besiedelten und ländlich geprägten Gebieten um Husby.

Hohltaube*Columba oenas*

Stock Dove

4 Nahrung suchende Ind. am Abend des 20.07. am Stadil Fjord auf Wiese zwischen Kiebitzen und Kampfläufnern.

Ringeltaube*Columba palumbus*

Common Wood Pigeon

Verbreitet, aber nicht sehr häufig. Dennoch täglich beobachtet.

Türkentaube*Streptopelia decaocto*

Eurasian Collared Dove

Besonders in den Städten (Holstebro, Hvide Sande, Søndervig und Ringköbing) häufig, aber auch in der Kultur- und Dorflandschaft regelmäßig zu beobachten.

Mauersegler*Apus apus*

Common Swift

Mehrere Kolonien in Ringköbing, dort am 18. und 19.07. jeweils etwa 30-40 Ind.

Buntspecht*Dendrocopos major*

Great Spotted Woodpecker

Am 14.07. 1 juv. auf Nadelbaum am Ferienhaus sitzend und rufend.

Feldlerche*Alauda arvensis*

Eurasian Skylark

Eine der häufigsten Singvogelarten. Besonders in der unmittelbaren Küstenregion, an den Dünen und in der Heidelandschaft bei Nahrungssuche und Singflügen gut zu beobachten.



Feldlerche, Dünenaufgang bei Husby, 10.07.2012

Rauchschwalbe*Hirundo rustica*

Barn Swallow

Fast täglich zu sehen: neben Landstraßen, über Äckern und Feldern sowie an diversen Brutplätzen, u.a. am 20.07. am Hafen von Lemvig; 3 juv. am Abend des 16.07. auf Parkplatz beim Stadil Fjord.

Mehlschwalbe*Delichon urbicum*

Common House Martin

Seltener beobachtet als Rauchschwalbe. Max. 10-15 Ind. am 19.07. in der Nähe des Hafens von Ringköbing am Fjord jagend.

Wiesenpieper

Anthus pratensis

Meadow Pipit

Wahrscheinlich recht häufig, jedoch selten unter guten Bedingungen beobachtet, so z.B. am 13.07. in der Heidelandschaft um Husby und am 15.07. in der Küstenregion bei Fjaltring.

Baumpieper

Anthus trivialis

Tree Pipit

Am 10.07. am Stadil Fjord 1 sing. Ind. in Tannenreihe; 1 ad. am 13.07. in der Heidelandschaft von Husby auf Kiefer singend.



Singender Baumpieper, Stadil Fjord am 10.07.2012

Bachstelze

Motacilla alba

White Wagtail

Täglich zu beobachten, in Strandnähe immer zu finden. Außerdem in den meisten anderen Lebensräumen wie Dörfern, Städten, Seen und Ackerland vorkommend.

Steinschmätzer

Oenanthe oenanthe

Northern Wheatear

Am 11.07. am Hafen von Thorsminde 1 Ind. zwischen den Findlingen an der Hafeneinfahrt umherfliegend.

Schwarzkehlchen

Saxicola torquatus

European Stonechat

1 M am 13.07. in der Heidelandschaft östlich der Dünen auf Kiefernbüschen.

Misteldrossel

Turdus viscivorus

Mistle Thrush

Mindestens 4 Ind. nach Regenschauer auf Feld bei Söndervig nach Nahrung suchend. Diverse Einzelbeobachtungen.

Amsel

Turdus merula

Common Blackbird

Täglich beobachtet, dabei sowohl in Wäldern, Heide- und Kulturlandschaft sowie urbaner Umgebung in Menschnähe zu finden. Keine nennenswerten Maximalzahlen.

Dorngrasmücke*Sylvia communis*

Common Whitethroat

In der Heidelandschaft östlich der Dünen am 13.07. ein sing. M auf der Spitze eines Kieferngebüschs am Wegesrand.

Fitis*Phylloscopus trochilus*

Willow Warbler

Nur einmal zu hören: am 13.07. in Kiefernwäldchen östlich der Dünen. Scheinbar nicht so stark verbreitet wie der verwandte Zilpzalp.

Zilpzalp*Phylloscopus collybita*

Common Chiffchaff

Täglich Gesang zu hören, besonders in den Mischwäldern der Ferienhaussiedlung häufig.

Kohlmeise*Parus major*

Great Tit

Einer der häufigsten Kleinvögel. Täglich zu hören und zu sehen, sowohl in Städten und Dörfern, als auch in den küstennahen Wald- und Heidelandschaften.

Blaumeise*Cyanistes caeruleus*

Eurasian Blue Tit

Weniger häufig als die größere Kohlmeise, dennoch regelmäßig beobachtet, besonders in den Mischwäldern um die Ferienhaussiedlung.

Neuntöter*Lanius collurio*

Red-backed Shrike

Ein wahrscheinl. juv. sitzt am 10.07. in den Dünen südlich von Husby auf einem abgestorbenen Baum; 1 ad. Pärchen am 13.07. auf einer mit Totholz bestandenen Kiefernwaldlichtung an Weg zwischen Ferienhaussiedlung und Strand, das sich neugierig zeigte und bis auf etwa 20 Meter herankam; am 20.07. in unmittelbarer Straßennähe beim Dorf Ramme ein ad. M auf einem Busch.



Weiblicher Neuntöter, Husby, 13.07.2012

Elster*Pica pica*

Eurasian Magpie

Der am weitesten verbreitete Rabenvogel. Täglich beobachtet, dabei in Städten, an Häfen, in Wäldern und in Strandnähe anzutreffen.

Eichelhäher

Garrulus glandarius

Eurasian Jay

Relativ selten beobachtet: 1 überfliegendes Ind. in der Innenstadt von Ringköbing am 19.07. ist die einzige nennenswerte Sichtung, ansonsten nur rufend in den Wäldern um die Ferienhaussiedlung.

Dohle

Corvus monedula

Western Jackdaw

Häufig, besonders in Dörfern und Städten vermehrt anzutreffen und dort der zahlenmäßig am stärksten vertretene Rabenvogel.

Saatkrähe

Corvus frugilegus

Rook

Nur eine Beobachtung: am 19.07. auf der Fahrt nach Ringköbing 1 Ind. am Straßenrand nach Nahrung suchend.

Nebelkrähe

Corvus cornix

Hooded Crow

Insgesamt 3-5 Ind. in Einzelbeobachtungen am 13.07. während Exkursion durch die Heide- und Kiefernwaldlandschaft östlich der Dünen bei Husby.

Während Autofahrt nach Ringköbing am 19.07. mehrere vereinzelte Ind. auf Nadelbäumen am Straßenrand.

Star

Sturnus vulgaris

Common Starling

Täglich zu beobachten, dabei besonders in den Abendstunden in größerer Zahl sich über den Feuchtwiesen sammelnd, häufig mehrere hundert bis tausend Ind.



Diesjähriger Star am 11.07.2012 in Thorsminde

Haussperling

Passer domesticus

House Sparrow

In größeren Dörfern und Städten sehr häufig, generell in Siedlungsnähe als Kulturfolger anzutreffen.

Feldsperling

Passer montanus

Tree Sparrow

Am 14.07. mindestens 3 Ind. in Vedersö. Recht häufig in der offenen Landschaft, z.B. am Stadil Fjord.

Buchfink*Fringilla coelebs*

Common Chaffinch

Besonders in den bewaldeten Arealen um die Ferienhaussiedlung anzutreffen; täglich zu hören und zu beobachten .

Grünfink*Carduelis chloris*

European Greenfinch

Regelmäßig zu beobachten und zu hören, einer der häufigsten Singvögel in Siedlungsbereichen.



Grünfink am 13.07.2012, Husby

Bluthänfling*Carduelis cannabina*

Common Linnet

Verbreitet. U.a. 1 M am 10.07. am Stadil Fjord; 1 ad. W am 11.07. an Küstenstraße nördlich von Husby; max. 15-20 Ind. am 13.07. in Heidelandchaft östlich der Dünen; 1 M und 1 W am 19.07. bei Vedersö.



Singender Bluthänfling am 13.07.2012, Husby

Rohrammer *Emberiza schoeniclus* Common Reed Bunting
Am Stadil Fjord regelmäßig beobachtet. Wo Schilffareale, da verbreitet.

Goldammer *Emberiza citrinella* Yellowhammer
Einer der häufigsten Singvögel, täglich beobachtet. U.a. war die Art durch ein vom 08.-10.07. permanent singendes M direkt am Ferienhaus präsent. Ansonsten insbesondere in den Dünen und in Strandnähe anzutreffen, ähnlich wie die zahlenmäßig seltenere Feldlerche.

Grauammer *Emberiza calandra* Corn Bunting
1 singendes M am 10.07. am Wegesrand in etwa sechs Metern Höhe auf einem Nadelbaum am Stadil Fjord; außerdem am 15.07. am Leuchtturm an der Steilküste von Trans 1 Ind. auf einem Zaundraht sitzend.



10.07.2012: singende Grauammer am Stadil Fjord

© Text + Fotos beim	
<u>Verfasser:</u>	Robert Biermann, Biberweg 1, 59071 Hamm, E-Mail: robertbiermann@gmx.de
<u>Titelbild:</u>	Goldammer am Strand von Husby
<u>Kamera:</u>	Nikon D5100 + Nikkor AF-S DX 55-300mm f4,5-5,6 + Soligor 2x DG Telekonverter